



ラクト・ゼリーとは・・・

ラクト・ゼリーは、乳酸菌をゼリー状に固めた製品であり、葉面散布用の植物活力材です。植物の免疫力が向上し、病気に対する抵抗力が高まります。

また、オーキシシンやサイトカイニンといった植物ホルモンが活性化し、生育促進、品質向上、食味向上が期待できます。



1袋当たり 1kg (≒1,000ml) 入り

使用方法

1. 苗床に種子を撒き、発芽後にラクト・ゼリーを葉面散布します。
ラクト・ゼリーは、水で50～150倍希釈し、まんべんなく散布してください。



【葉面散布後の状況】


2. 本葉が付いた頃に、ラクト・ゼリーを散布します。
ラクト・ゼリーは水で50～150倍希釈し、1反当たり30～100Lを目安に10日に1回、収穫時期まで葉面散布してください。



【葉面散布の状況】

●●ラクト・ゼリーの希釈方法●●

- ① ラクト・ゼリーを計量カップやペットボトルの蓋で計量し、ジョウロ、或いは噴霧器に入れてください。(使用量は下記の表を参照)



- ② ラクト・ゼリーの50～150倍の水をジョウロ或いは、噴霧器に入れてください。



- ③ ジョウロ、或いは噴霧器を軽く振って、混ぜてください。



50倍希釈早見表 (目安)

散布面積	10a	5a	1a	0.5a
ラクト・ゼリー	2000ml	1000ml	200ml	100ml
水	100L	50L	10L	5L

※1反≒10a≒1,000m²

※ラクト・ゼリーの計量にペットボトル蓋を用いた場合、なみなみ1杯≒7ml (ラクト・ゼリー30ml≒4杯
ラクト・ゼリー60ml≒9杯)



保存方法


● 未開封の場合

ラクト・ゼリーには**生きた乳酸菌**が含まれていますので、冷蔵保存で、製造日より3ヶ月以内で使用してください。

● 開封済みの場合

開封後のラクト・ゼリーは、綺麗に洗浄したペットボトルに入れ、しっかりと蓋を閉めて冷蔵庫に保存してください。（ラクト・ゼリーをペットボトルに入れる際に、漏斗があると入れやすいです。）

ペットボトルのサイズが1Lサイズであれば、ラクト・ゼリーは全て入ります。



使用上の注意

※生育に応じて、散布量を調整してください。

※ラクト・ゼリーの希釈倍率は50~150倍の範囲で使用してください。

※噴霧器を農薬等と兼用される場合は、水で十分洗浄してから使用してください。

※農薬を使用する場合は、農薬の使用日から4日以上空けてラクト・ゼリーを散布してください。

栽培事例

● ハクサイ

自己免疫力の向上、生育促進により、病害が少なく、大きく生育したハクサイ



● その他

生産者からは、食味、収量が向上するなどのご意見をいただいております。

